


Bollettino n. 1 del 5 aprile 2023
VITE
Andamento meteo (in collaborazione col Servizio Meteorologia e Climatologia di Arpav):

L'andamento mite del periodo precedente è stato interrotto dall'afflusso di masse d'aria fredda da Nord a partire dal fine settimana scorso. Le temperature sono scese sensibilmente e martedì e mercoledì le minime hanno raggiunto valori prossimi allo zero su quasi tutto il territorio. La debole perturbazione transitata domenica ha apportato delle precipitazioni di stampo temporalesco e di scarso rilievo solo nella pedemontana e nella pianura tra Verona e Vicenza.



TEMPERATURE MASSIME, MINIME E PRECIPITAZIONI DELLA SETTIMANA DAL 29/03 al 04/04 – ARPAV

Fase fenologica

La ripresa vegetativa è iniziata quasi ovunque, generalmente in anticipo sensibile sullo scorso anno e sulla media di 5-10 giorni, a seconda degli ambienti.

Stadio mediamente compreso tra la gemma cotonosa (BBCH 05) e il germogliamento (BBCH 09) delle varietà più anticipate (Glera, Chardonnay ecc.). Su queste, nei versanti più avvantaggiati di media e bassa collina si notano già 2-4 foglie libere (BBCH 12-13).



Pinot Grigio (*Extenda Vitis*, Portogruaro 31/03), Glera (*Extenda Vitis*, Pramaggiore 31/03) e Corvinon (*F.Bonomi*, Negrar 31/03)



Fenogrammi di Chardonnay e Glera (*Extenda vitis*, Istrana TV)

Stato parassitario:

Nottue: sono segnalati dei ritrovamenti negli ambienti di collina abituali, limitatamente alle piante di bordo. Per ostacolare le rosure delle larve sulle gemme non ancora germogliate il sistema più efficace è quello della raccolta manuale delle stesse durante le ore notturne oppure quello di applicare degli ostacoli sul fusto (con collarini o colle) per impedirne la risalita dal terreno.

Indirizzi di difesa:

Nei vigneti solitamente attaccati dall'**Escoriosi**, a partire dalla fase di germogliamento avvenuto, è opportuno prevedere l'esecuzione di un intervento fungicida preventivo (es. Metiram, Folpet, Rame) ma solo in evenienza di eventi piovosi.

Nei confronti dell'**Oidio**, nelle situazioni nelle quali lo scorso anno si sono verificate infezioni importanti e/o tardive, è consigliato effettuare un trattamento con prodotti curativi e/o eradicanti (es. Meptil Dinocap o Zolfo, il primo agisce anche con temperature relativamente basse, il secondo sublima con temperature superiori ai 16°C.)

Nei comprensori nei quali si attua il metodo della confusione sessuale contro la **Tigioletta** è necessario affrettare l'installazione degli erogatori, se non ancora ultimata.

SC



Escoriosi su Cabernet S. (*Extenda Vitis*, Trebaseleghe (PD))



Oidio su tralci di Corvinone (F. Bonomi, S. Martino BA (VR) 24/03)



Barriera fisica contro le Nottue (*Extenda Vitis*, Combai (TV) 31/03)

Andamento meteo autunno invernale 2022-23 e scarti sulla norma - Dati ed elaborazioni ARPAV Servizio Meteorologia e Climatologia
